

果菜類

(トマト・キュウリ・ナス・ピーマン・他)				
<b>播種</b>	.....	<b>育苗</b>	.....	<b>定植</b>
種子粉衣 (接木の場合は 台木となる種子)		定植7~10日前に、 2000倍液を葉面散布		*注1 ・定植15~20日後に2000倍液を葉面散布 ・収穫期間中7~10日おきに2000倍液を 葉面散布(3回以上)
<b>播種</b>	.....	<b>定植</b>	.....	<b>収穫</b>
種子粉衣 (接木の場合は 台木となる種子)		*注1 ・定植15~20日後に2000倍液を葉面散布 ・結実後2000倍液を葉面散布		
(イチゴ)				
<b>植付け</b>	.....	<b>育苗</b>	.....	<b>定植</b>
ランナーを 1000倍液に浸漬後 植付け		2000倍液を葉面散布		*注1 ・一番果収穫より7~10日おきに 2000倍液を葉面散布
(豆類)				
<b>播種</b>	.....	<b>3~5葉期</b>	.....	<b>着蕾期</b>
種子粉衣		2000倍液を葉面散布		2000倍液を葉面散布
				<b>開花期</b>
				2000倍液を葉面散布
				<b>収穫</b>

葉菜類

(キャベツ・ハクサイ・レタスなど結球野菜)				
<b>播種</b>	.....	<b>育苗</b>	.....	<b>定植</b>
種子粉衣		本葉3~5枚時に 2000倍液を葉面散布		*注1 ・結球後2000倍液を葉面散布 ・収穫10日前に2000倍液を葉面散布
(ほうれん草・小松菜など軟弱野菜)				
<b>播種</b>	.....	.....	.....	<b>収穫</b>
種子粉衣				・生育期に10日おきに2000倍液を葉面散布 ・収穫の7日前に、2000倍液を葉面散布

根菜類

(ダイコン・ニンジン・ゴボウ等)				
<b>播種</b>	.....	.....	<b>5~6葉期</b>	<b>収穫</b>
種子粉衣			2000倍液を葉面散布。その後収穫までに2000倍液を1回葉面散布	
(イモ類)				
<b>播種</b>	.....	<b>5~6葉期</b>	.....	<b>着蕾期</b>
種イモを葉面散布用 1000倍液に浸漬後 催芽させ、植付け		2000倍液を葉面散布		2000倍液を葉面散布 または土壌灌水
(玉ねぎ・ニンニク)				
<b>播種</b>	.....	<b>定植</b>	.....	<b>収穫</b>
種子粉衣 または、1000倍液浸漬		*注1 ・移植後2~3週間後に2000倍液を葉面散布又は土壌散布 ・生育期から10日おきに2000倍液を葉面散布又は土壌散布 (2~3回)		

お茶

<b>一番茶</b>	.....	<b>二番茶</b>	.....	<b>三番茶</b>	.....	<b>9月中-11月下</b>
それぞれの茶摘採10~14日前に10a当たり葉面散布用を 100~200cc必要水量に希釈して葉面散布						10a当たり100~150ccを必要水量に 希釈して葉面散布(霜害)